BIBLIOTHÈQUE
DE L'HERBIER BOISSIER

Doublet extrait des Bibliothèques Boissier et de Candolle lors de leur fusion

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK
BASEL

Rm. A III 164

*56,500

Katalog

Digitized by Google

REVISIO

PLANTARUM MINUS COGNITARUM

QUAS HORTUS PATAVINUS COLIT

AUCTORE

ROBERTO DE VISIANI

HORTI EJUSDEM PRAEFECTO

Inter vegetabilia in Horto Patavino exculta plura jam alebantur nominibus designata, quorum exactitudo neutiquam recognosci poterat usque dum partes omnes fructificationis emitterent, quibus solis vera cognitio generum, nec raro specierum, inniti debet.

Horum aliqua recentius florida haecce nomina corrigendi occasionem praebuere, quam arripere gestiens, talium plantarum diagnoses hic loci exarandas edendasque suscipio.

Patavii m. Julio MDCCCLV.

Digitized by Google

Digitized by Google

1. Pinus Parolinii *Vis.*

P. foliis geminis, margine cartilagineo-serrulatis scabris, vaginis rugosis longiusculis, strobilis ovato-conicis basi truncatis oppositis verticillatisque brevissime pedunculatis patulis erectisve, folio paullo brevioribus, squamarum apophysi nitida, latere superiore convexa, argute carinata, umbone depresso radiatim rimoso, junioribus ovatis pedunculatis erectis apophysi recurve mucronata, seminum ala trapetioidea nuculam ter superante ejusque basim obtusam anguste marginante.

Syn. P. Pallasii *Parol.* sem. h. bot. Parolin. 1841, p. 5, non. *Lamb.*

Hab. in devexitatibus vallibusque montis Idae in Bithynia, ubi sola vastas conficit sylvas. Observavit ibidem jam ab anno 1819 inque hortum proprium e seminibus eduxit aliisque communicavit cl. *Albertus Parolini.* Flor. Apr. Majo.

2. Juniperus Bonatiana *Vis.*

J. arborea, glaucescens, ramis patentissimis, foliis oppositis decussato-imbricatis adpressis ovato-rhombeis,

Digitized by Google

apice gibboso-trigonis, dorso glandula oblonga impressis, ecarinatis, junioribus brevissimis lanceolatis acuminatis pungentibus erecto-patulis, ramulis tetraquetris pendulis, fructiferis brevissimis strictis, galbulis pedunculatis globosis tuberculatis.

Syn. J. thurifera. H. Pat. nec alior.

Hab. . . . Colitur in H. Patav. ubi fructificat a Majo in aestatem. Galbuli sub rore caeruleo nigri, 4-5 tuberculati.

Obs. Affinis *J. sabinoidi*, Griseb. *J. turbinatae*, Gusson. *J. thuriferae*, L., quae differt colore totius plantae laete viridi, et galbulis obovato-ovoideis basi breviter protractis. Dixi in memoriam antecessoris mei dignissimi prof. *Jos. Ant. Bonato.*

3. Juniperus Cabiancae *Vis.*

J. arborescens, viridis, ramis erecto-patulis, foliis oppositis, omnibus decussate-imbricatis adpressis ovato-rhombeis acutis, dorsi convexi medio glandula oblonga impressis, ecarinatis, ramulis tetraquetris, fructiferis strictis brevissimis, galbulis pedunculatis subglobosis, apice truncatis sublobatisve, pruinosis opacis laevibus, demum nigro-coeruleis.

Habui ex horto egregii viri *Jacobi Cabianca* sub nomine *J. phoenicoeae*, L., cui similis, sed a qua differt foliis acutis, ramulis tetraquetris et forma galbuli apice truncati vel etiam emarginati et bi-trilobi. Color etiam fructus qui zizyphinus et nitidus in *J. phoenicea* L., in nostra fuscus opacus.

4. Daphne Elisae *Vis.*

D. floribus terminalibus aggregatis pedunculatis lanuginosis, laciniis perianthii subcordato-ellipticis apice rotundatis emarginatisve, foliis oblongo-obovatis obtu-

Digitized by Google

sis coriaceis glabris, margine subrevolutis, junioribus floralibusque flore brevioribus margine pilosiusculis, caulis erecti ramis puberulis.

Hab. in Mexico. Floret vere. Flores albo-rosei fragrantes.

Obs. Inter *D. Cneorum* et *D. collinam* media ; illi floribus a foliis exsertis, huic foliis similis. Differt vero *D. collina*, L. floribus sessilibus, laciniis perianthii ovatis, foliis subtus villosis, floralibus flores superantibus : *D. Cneorum*, L. foliis obverse lanceolato-linearibus glabris, laciniis perianthii oblongis, tubo nervoso, floribus subsessilibus, caulibus decumbentibus. Dixi in honorem *Elisae Parolini* botanices plantasque pingendi cognitione eximiae. Syn. D. Delahayana Hort.

5. Eupatorium Morisii *Vis.* Orto bot. di Pad 1842, p. 80.

E. fruticosum, sempervirens, ramis teretibus glabris, foliis oppositis petiolatis ovalibus utrinque attenuatis nitidis glabris penninerviis laxe crenato-serratis, basi integris, dentibus glandula terminatis, capitulis terminalibus cymoso-corymbosis cylindricis subsexfloris, pedicellis puberulis, involucri squamis arcte imbricatis obtusis, apice piloso-laceris, glanduloso-verruculosis estriatis.

Vidi primum in H. bot. Taurinensi e seminibus ortum a cl. Bertero missis, et cl. *Jos Moris* horti ejusdem praefecti nomine decoravi.

6. Ruellia undulata *Vis.* Sem. rar. h. Patav. 1847, p. 4.

R. velutina pumila, caule herbaceo subramoso, foliis ovatis petiolatis, margine undulatis integris, floribus sessilibus axillaribus oppositis, bracteis binis oblongis petiolatis basi munitis, calycis laciniis linearibus strictis, corolla infundibuliformi, capsula spathulato-ovali acuminata.

Digitized by Google

Habui semina sub nomine *Ruelliae deccanensis* (quid?) ex Horto botanico ad *Bombay* a cl. doct. *Gibson* communicata. Flores lilacini. Planta annua.

7. Clerodendron Manetti *Vis.* Sem. h. Patav. 1848 et 1849.

C. ramulis tetragonis cum foliis pedunculisque pube brevi molli subcanescentibus, foliis petiolatis ovali-lanceolatis acuminatis integris, paniculae terminalis laxae ramis trifide cymosis, bracteis obverse lanceolatis acutis deciduis pilosis, calyce campanulato nutante esquamato quinquefido laciniis lanceolatis erectis apice conniventibus, corollae hypocraterimorphae superne extus puberulae tubo angusto cylindrico calycem quadruplo superante, limbo quinquefido.

Syn. Clerodendron splendens *Manett.* cat. pl. h. Modic. suppl. II, p. 9, non *Don.*

Obs. Locum obtinet inter *Euclerodendra paniculata*, Schauer in DC. prodr. XII, p. 666, a quibus omnibus differt. Dixi in honorem *Jos. Manetti* rei horticolae peritissimi hortique Modiciensis directoris eximii, a quo hortus Patavinus habuit.

8. Teucrium densiflorum *Vis.* Sem. rar. h. patav. 1847, p. 4.

T. foliis cordatis truncatisve rugosis, spica cylindrica compacta, verticillastris contiguis sexfloris, calycis basi scrotiformi, dente supremo orbiculato maximo, infimis lanceolato-oblongis lateralibus paullo longioribus, corollae lobis ovato-triangularibus, infimo basi truncato biloboque.

Obs. Colitur sub nomen *T. lamiifolii*, Urv. *T. Arduini*, L., quod differt foliis basi cuneatis, spica laxiore, calycis basi integra nec emarginato-biloba, dente calycino supremo ovato-cuspidato, infimis linearibus, corollae

Digitized by Google

ochroleucae lobis lanceolatis, infimo basi cuneato integro. Fl. minuti albi. Fl. Majo. Junio. Perennis.

9. Eremostachys iberica *Vis.* Sem. rar. h. patav. 1846, p. 4.

E. foliis bipinnatisectis, laciniis linearibus incisis obtusis, floralibus inciso-palmatifidis, calyce infundibuliformi, dentibus late truncato-emarginatis exserte spinoso-mucronatis, styli lobis brevissimis valde inaequalibus.

Syn. Phlomis iberica. H. Paris. — Fl. citrini.

10. Calamintha Fenzlii *Vis.*

C. fructiculosa, adscendens, pube tenuissima subcanescens, foliis petiolatis ovato-rhombeis ovalibusve subserratis, floralibus decrescentibus, racemis foliatis laxiusculis, cymis pedunculatis 5-9-floris, calycis tubulosi pubescentis 13-nervii dentibus ovato-acuminatis subaequalibus tubo triplo brevioribus, intus basi barbatis, acheniis oblongis apice rotundato puberulis.

Syn. Micromeria dalmatica *Fenzl* cat. sem. h. Vind. 1851 non *Benth.*

Obs. Differt ab hac *Calamintha origanifolia Vis.* non *Host* calycibus campanulato-tubulosis brevioribus hirtis, dentibus subulatis tubo calycino paullo brevioribus. — Antherae loculi apice juncti et basi divaricati ut in *Calamintha*, nec e contra ut in *Micromeria.*

11. Ligustrum Kellerianum *Vis.*

L. ramis obtuse quadrangulis, superne puberulis, patulis, foliis petiolatis ovalibus aut ovali-acuminatis glabris, supra nitidis subtus pallidioribus, floralibus lanceolatis persistentibus, panicula terminali brachiata laxa ramis patentissimis pubescentibus, floribus bracteatis pedicellatis.

Syn. Ligustrum ovalifolium Hort. non Hasskrl. Fl. candidi, ingrate olentes. Fl. Jun. Jul.

Digitized by Google

Obs. Differt ab hoc *L. ovalifolium Hasskrl.*, si fides habenda est diagnosi hujusce plantae in *Walp.* Rep. bot. VI, p. 462, ramis teretibus glaberrimis, panicula contracta subracemosa, floribus subsessilibus. Hinc aut erronea diagnosis aut nomen mutandum. — Dixi in honorem doct. *Ant. Keller* olim Horto Patavino adjuncti, nunc in Patavino Athenaeo vicarii rei agricolae professoris egregii.

12. Ligustrum Massalongianum *Vis.*

L. ramis teretibus pilosiusculis, conspicue crebreque lenticellatis, erectis, foliis lanceolatis acuminatis mucronulatis in petiolum attenuatis glabris opacis laevibus, floralibus lanceolatis persistentibus, panicula terminali compacta ramis erectis piloso-pubescentibus, floribus bracteatis pedicellatis glabris.

Syn. Ligustrum spicatum Hort. non *Haw.* Fl. candidi. Fl. aestate.

Obs. Vagatur etiam in hortis sub nomine *L. angustifolii.* Booth., quod vero differt foliis oblongo-lanceolatis basi latioribus, margine serrulato-scabris, subtus glaucis, et ramis teretibus velutinis non lenticellatis, quantum ex hujusce plantula juniore nec florida conjicere licet. Species sempervirens floribunda lichenologi strenui deque palaeontologia vegetabili italica apprime meriti prof. *A. B. Massalongo* nomine decorata.

(Extr. ex Actis I. R. Inst. Ven. Scient. Liter. et Artium. Vol. I, Ser. III)

Venetiis, 1855. Typ. Antonelli

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google